



UNIDAD 4: MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y CHOQUES

1. ¿Qué magnitud tiene el momento lineal de un camión de 10000kg que viaja con $v=12\text{m/s}$? b) ¿Qué rapidez tendría que tener una camioneta de 2000kg para tener i) el mismo \mathbf{p} ? ¿La misma K ?
2. Dos vehículos se aproximan a una intersección. Uno es una camioneta de 2000kg que viaja a 14m/s con dirección E-O (la dirección $-x$), y el otro es un auto de 1500kg que va de S a N (la dirección $+y$) a 23m/s . a) Determine las componentes x e y del \mathbf{p} neto del sist. b) ¿Cuáles son la magnitud, dir y sentido de este \mathbf{p} ?
3. Una pelota de golf de 0.045kg adquiere una $v=25\text{m/s}$ al golpearla con un palo. Si el Δt de contacto es de 2ms , ¿qué \mathbf{F}_{Med} actúa sobre la pelota? ¿Es significativo el efecto del $\text{Peso}_{\text{pelota}}$ durante este tiempo? ¿Por qué?
4. Una pelota de béisbol de $m_p=0.145\text{kg}$. a) Si se lanza con una $v=45\text{m/s}$ y después de batearla tiene $v=55\text{m/s}$ en sentido opuesto, ¿qué magnitud tienen el cambio de \mathbf{p} de la bola y el \mathbf{J} aplicado a ella con el bate? b) Si la pelota está en contacto con el bate durante 2ms , calcule la magnitud de la \mathbf{F} media aplicada por el bate.
5. Un motor del sistema de maniobras orbitales del transbordador espacial ejerce una fuerza \mathbf{F} de 26700 N durante 3.90s , expulsando una masa insignificante de combustible en comparación con la masa de 95000 kg de la nave. a) ¿Qué impulso tiene la \mathbf{F} en el lapso de 3.90s ? b) ¿Cómo cambia el momento lineal de la nave por este impulso? c) ¿Y su \mathbf{v} ? d) ¿Por qué no podemos calcular el cambio resultante de la K del transbordador?

6. Una piedra de 2kg se desliza hacia la derecha por una sup horizontal sin fricción a 5m/s , cuando de repente es golpeada por un objeto que ejerce una gran fuerza horizontal sobre ella por un breve lapso. La gráfica en la fig indica la magnitud de esa F como función del tiempo. a) ¿Qué impulso ejerce esa fuerza sobre la piedra? b) Calcule la magnitud, dirección y sentido de la \mathbf{v} de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar si esa F actúa i) hacia la derecha o ii) hacia la izquierda.




7. (opcional) Dado el sistema de la figura (a) encuentre la aceleración de ambos bloques. a) Planteando la segunda ley de Newton para cada cuerpo por separado. b) Planteando el movimiento del centro de masa del sistema de dos partículas. Las figuras (b) y (c) pueden ayudarle.



8. En una mesa de aire horizontal, el disco A ($m_A=0.25\text{kg}$) se mueve hacia el B ($m_B=0.35\text{kg}$) que está en reposo. Después del choque, A se mueve a 0.12m/s a la izquierda, y B a 0.65m/s a la derecha. a) ¿Qué rapidez tenía A antes del choque? b) Calcule el ΔK total del sistema durante el choque.
9. Un cazador parado sobre un estanque congelado sin fricción usa un rifle que dispara balas de 4.2g a 965m/s . La masa del cazador y el rifle es 72.5kg . El hombre sostiene con fuerza el arma, calcule la \mathbf{v} de retroceso del cazador si tira a) horizontalmente y b 56° por encima de la horizontal.
10. Usted está de pie sobre una gran plancha de hielo sin fricción, sosteniendo una gran roca. Para salir del hielo, usted tira la roca con una velocidad relativa a la Tierra de 12m/s , a 35° por arriba de la

horizontal. Si su masa es de 70kg y la masa de la roca es de 15kg, ¿qué rapidez tiene usted después de lanzar la roca?

11. Dos asteroides de igual masa entre chocan de refilón. El asteroide A, que viajaba a 40m/s, se desvía 30° con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide B viaja a 45° con respecto a la dirección original de A. a) Calcule la v de cada uno después del choque. b) ¿Qué fracción de la K_i de A se disipa durante el choque?




12. Un pez de 15kg, que nada a 1.1m/s, de repente engulle un pez de 4.5kg que estaba en reposo. Desprecie los efectos de arrastre del agua. a) Calcule la rapidez del pez grande inmediatamente después de haberse comido al pequeño. b) ¿Cuánta energía mecánica se disipó durante esta comida?

13. Un auto de 1050kg se desplaza hacia el O a 15m/s por una ruta cuando choca con un camión de 6320kg, que viaja hacia el E a 10m/s. Ambos vehículos quedan pegados. a) ¿Qué v (magnitud, dir y sentido) tendrán los dos vehículos inmediatamente después del choque? b) ¿Qué rapidez debe llevar el camión para que ambos vehículos se detengan por el choque? c) Encuentre el ΔK del sistema de los dos vehículos en las situaciones del inciso a) y b). ¿En cuál situación tiene mayor magnitud el cambio de energía cinética?


14. Una bala de rifle de 12g se dispara a 380m/s contra un péndulo balístico de 6kg suspendido de un cordón de 70cm de longitud. Calcule a) la distancia vertical que sube el péndulo, b) la K inicial de la bala y c) la K de la bala y el péndulo inmediatamente después de que la bala se incrusta en el péndulo.

15. Los bloques A (masa 2kg) y B (masa 10kg) se mueven en una sup horizontal sin fricción. En un principio, el bloque B está en reposo y el A se mueve hacia él a 2m/s. Los bloques están equipados con protectores de resorte ideal. El choque es de frente, así que todos los movimientos antes y después del choque están en una línea recta. a) Calcule la energía máxima almacenada en los protectores de resorte y la velocidad de cada bloque en ese momento. b) Calcule la velocidad de cada bloque una vez que se han separado.


16. La figura muestra una placa circular de metal de radio $2R$ a la que se le ha extraído un disco de radio R . A esta pieza la llamaremos "objeto X". Encuentre la posición del centro de masa de este objeto.



17. Una camioneta de 1200kg avanza en una autopista recta a 12m/s. Otro auto, de masa 1800kg y rapidez 20m/s, tiene su centro de masa 40m adelante del centro de masa de la camioneta. a) Determine la posición del CM del sistema formado por los dos vehículos. b) Calcule la magnitud del momento lineal total del sistema, a partir de los datos anteriores. c) Calcule la v_{CM} del sist. d) Calcule el momento lineal total del sistema, usando la v_{CM} . Compare su resultado con el de b).



18. Las esferas A, de 0.020 kg, B, de 0.030 kg y C, de 0.050 kg, se acercan al origen deslizándose sobre una mesa de aire. Las v_i de A y B se indican en la figura. Las tres esferas llegan al origen simultáneamente y se pegan. a) ¿Qué componentes x e y debe tener la v_i de C si después del choque los tres objetos tienen una velocidad de 0.50 m/s en la dirección $+x$? b) Si C tiene la velocidad obtenida en el inciso a), ¿cuál es el $^{\circ}K$ del sistema de las tres esferas como resultado del choque?



19. En el centro de distribución de una compañía de embarques, un carrito abierto de 50kg está rodando hacia la izquierda con $v=5$ m/s. La fricción es despreciable. Un paquete de 15kg baja deslizándose por una rampa inclinada 37° sobre la horizontal y sale proyectado con una rapidez de 3m/s. El paquete cae en el carrito y siguen avanzando juntos. Si el extremo inferior de la rampa está a una altura de 4m sobre el fondo del carrito, a) ¿qué v tendrá el paquete justo antes de caer en el carrito? b) ¿Qué v final tendrá el carrito?

