GEOLOGÍA DE LOS CUERPOS ÍGNEOS

EXTRUSIVOS

Lic. Javier Gomez Figueroa

Cátedra de Petrología Ígnea y

Metamórfica

Petrología Ígnea y Metamórfica

En esta clase intentaremos dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué procesos generan los mecanismos de erupción magmáticos e hidromagmáticos?
2. ¿Como es la formación de las rocas ígneas extrusivas?
3. Geometría de los edificios volcánicos: calderas, estratovolcanes, domos, lavas, cono de escoria, anillo de tobas y maares

1: yacencia y textura

De acuerdo a la yacencia se clasifican en:

Volcánicas, Plutónicas, Hipabisales y Filonianas

Clasificaciones según la textura y yacencia

De acuerdo a la textura se clasifican en tres categorías:

Rocas Faneríticas: Se incluyen las que tienen cristales que son visibles e identificables a simple vista

Rocas Afaníticas: Están constituidos por cristales y componentes, que son demasiados pequeños para ser reconocidos a simple vista.

Rocas Fragmentadas: Están constituidas por material ígneo desagregado, depositado y posteriormente amalgamado. Los fragmentos pueden incluir, rocas preexistentes (líticos), fragmentos de cristales y vidrio.

Roca con textura granular

Roca con textura volcánica

Ignimbrita

Roca con textura porfírica

Diagrama TAS

IUGS, Le Bas et al. (1986)

- Clasificación de Rocas Volcánicas basada en la composición química de roca total
- Se aplica a rocas volcánicas frescas ($H_2O < 2\%$ y $CO_2 < 0.5\%$) en las que no es posible determinar la composición modal

EL MAGMA – GENERALIDADES -

- Palabra griega = “pasta”
- Masa silicatada parcialmente fundida
- Componentes sólidos y gaseosos (fases en solución)
- Interior de la Tierra o Planeta
- 700° - 1200° C aprox.
- En superficie = LAVA

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MAGMAS

- Temperatura (proceso adiabático)
- Presión (presión litostática)
- Composición Química (contenido de sílice % wt SiO₂)
- Contenido de Cristales (fase sólida)
- Contenido de Volátiles (fase gaseosa)
- Densidad

VISCOSIDAD

Resistencia de un líquido a fluir

yoDERM

VISCOSIDAD

Resistencia de un líquido a fluir

TEMPERATURAS DE LOS MAGMAS

Medición directa, medición óptica y laboratorio

Temperaturas de erupción estimadas en rocas volcánicas

Tipo de roca	Temperatura (°C)
Riolítico	700-900
Dacítico	800-1100
Andesítico	950-1200
Basáltico	1000-1200

Composição do magma

O magma é formado por uma mistura de silicatos fundidos, por cristais em suspensão e por diversos gases, que se designam, globalmente, substâncias voláteis.

TIPOS DE LAVAS

Lavas cordadas

pahoehoe

Pahoehoe

lavas aa

Lava almohadillada

MECANISMOS ERUPTIVOS

Magma = líquido a alta T° + gases

Bajas velocidades = Fluido $\pm$ viscosos

Altas velocidades = Rotura frágil

Regímenes de flujo de dos fases:

1. Bajos volúmenes de gas, lavas de poco a muy viscosas

2 y 3. Magmas poco viscosos (funcionan como pulsos)

4. Altos volúmenes de gas, generalmente magmas viscosos, ocurre fragmentación del magma

MECANISMOS ERUPTIVOS

Magma = líquido a alta T° + gases

Bajas velocidades = Fluido $\pm$ viscosos

Altas velocidades = Rotura frágil

Regímenes de flujo de dos fases:

1. Bajos volúmenes de gas, lavas de poco a muy viscosas

2 y 3. Magmas poco viscosos (funcionan como pulsos)

4. Altos volúmenes de gas, generalmente magmas viscosos, ocurre fragmentación del magma

MECANISMOS ERUPTIVOS

Magma = líquido a alta T° + gases
Bajas velocidades = Fluido $\pm$ viscosos
Altas velocidades = Rotura frágil

Volcanismo Efusivo

Erupción de lava = derrames de magma en superficie
 $T^{\circ} < T_{lig}$
Fase continua: Fundido.
Ascenso y descarga del magma con pocos volátiles.

Volcanismo Explosivo

**Erupción de piroclastos principalmente
Gran cantidad de volátiles acumulados en el techo de
una cámara magmática**

Erupción Volcán LASCAR del 20-07-00 horas 11,00 AM local.
20 minutos después de la primera explosión.
Foto: Robert Pankhurst

FRAGMENTACIÓN MAGMÁTICA

FRAGMENTACIÓN

Proceso por el cual una fase continua líquida o sólida se transforma en una fase gaseosa continua con partículas suspendidas.

Formación de depósitos volcanoclásticos		
Explosiones magmáticas	Erupciones Piroclásticas	Procesos volcánicos primarios
Explosiones freatomagmáticas		
Explosiones de vapor o freáticas		
Fragmentación por enfriamiento o congelamiento	Procesos autoclásticos	
Fragmentación por flujo (autobrechización)		
Fragmentación epiclástica		Procesos superficiales secundarios

FRAGMENTACIÓN

Proceso por el cual una fase continua líquida o sólida se transforma en una fase gaseosa continua con partículas suspendidas.

Cashman & Scheu, 2015

EXSOLUCIÓN

- Volátiles disueltos afectan a la naturaleza de las erupciones, pudiendo ser explosivas o no explosivas
- El volátil dominante es el H₂O, siendo el CO₂ el segundo en importancia (especialmente importante es en los basaltos).
- Solubilidad principalmente controlada por la presión confinante.
- La solubilidad de los volátiles disminuye a medida que asciende a superficie, llegando a separarse como fases distintas.
- La exsolución de los gases comienza cuando la presión de vapor iguala a la presión confinante.

MEZCLA DE MAGMAS COMO MEDIO GENERADOR DE ERUPCIONES EXPLOSIVAS

https://ayudahispano-3000.blogspot.com/2015/06/geologia_13.html

<http://www.annarecetasfaciles.com/files/bizcocho-marmolado-3-815x458.jpg>

MEZCLA DE MAGMAS COMO MEDIO GENERADOR DE ERUPCIONES EXPLOSIVAS

- Dos magmas de diferentes composiciones, temperaturas y diferente contenido de volátiles se ponen en contacto en una cámara magmática subsuperficial
- La mezcla puede darse por diversas circunstancias:

a. Adición de magma a una cámara puede causar el exceso de la presión de fluido en la misma, llevando al rompimiento del techo de la cámara y la consecuente emisión de magma en superficie.

b. Una cámara con un magma riolítico con un contenido de volátiles moderado es rellenada con un magma básico, produciendo un sobrecalentamiento de la base del magma riolítico, y por ende, una convección ascendente de este magma.

c. Inyección de magma básico rico en volátiles, los cuales son transferidos por convección, difusión y mezcla al magma riolítico con pocos volátiles.

d. En el caso b., la transferencia de calor puede producir un enfriamiento rápido del magma básico, causando cristalización, y por ende, aumento de la presión de fluido.

EXPLOSIONES DE VAPOR O FREÁTICAS Y ERUPCIONES FREATOMAGMÁTICAS

- Interacción magma caliente con agua produce *actividad hidrovulcánica*.
- El agua puede ser un reservorio de agua subterránea o la superficie de un cuerpo de agua (e.g. lago cratérico, lago, agua de mar).
- El efecto inmediato es el *sobrecalentamiento*, ebullición, volatilización, ascenso de la presión del gas del agua externa, expansión explosiva del gas producido.
- La intensidad de la actividad es controlada por la razón *agua : masa de magma* y la cantidad de sobrecalentamiento del agua.
- Agua : *magma bajo* (menor a 0.2) el agua externa controla escasamente la fragmentación, y el dominio lo tienen los mecanismos revisados anteriormente (volátiles magmáticos).
- Agua : *magma alto* (sobre los 0.3), la fragmentación y los niveles de explosividad son altos (mucho participación del agua).

EXPLOSIONES DE VAPOR O FREÁTICAS Y ERUPCIONES FREATOMAGMÁTICAS

Las erupciones hidrovulcánicas pueden darse por:

- a. Magma ascendente que interactúa con agua subterránea.
- b. Magma en un sistema abierto en contacto con un cuerpo de agua (lago, océano, etc.).
- c. Flujo de lava fluyendo en un cuerpo de agua o sedimento saturado en agua.
- d. Flujo piroclástico moviéndose sobre un cuerpo de agua o sedimento saturado en agua.
- e. Magma ascendiendo en un sistema hidrotermal caliente con temperaturas cercanas a la ebullición.

Geometría de los edificios volcánicos

Volcán: Es una acumulación de materiales expulsados de forma explosiva o efusiva, a partir de una o varios «ventiladeros» (respiraderos) o fisuras en la superficie de la Tierra o de otros planetas (Siebert et al., 2015).

De acuerdo con Németh & Kereszturi (2015):

Monogenético: Volcán de pequeño volumen (típicamente $\leq 1 \text{ km}^3$), que se ha construido por una erupción continua o varias erupciones discontinuas alimentadas por uno o varios cuerpos de magma.

Poligenético: Volcán formado a lo largo de cientos o miles de años a través de erupciones sostenidas, con un sistema alimentador y conductos eruptivos estables.

El Hierro Islas Canarias

Geoformas
volcánicas

- **Inicialmente:** En base al tipo de actividad, magmas y productos eruptivos
- **En la actualidad:** Escala geomorfológica, origen constructivo v/s erosivo, mono v/s poli génesis, tipos de actividad, tipo y volumen de magma y materiales emitidos.

Basado en Thouret (1999), de Silva & Lindsay (2015)

Tamaño de grano (mm)	Denominación	
> 64	Bloque/bomba	
16 - 64	Lapilli	grueso
4 - 16		medio
2 - 4		fino
1 - 2	Ceniza	muy gruesa
0,5 - 1		gruesa
0,5 - 0,25		media
0,125 - 0,25		fina
0,0062 - 0,125		muy fina
< 0,0062		extremadamente fina

TEFRA

VOLCANES MONOGENÉTICOS

• CONOS DE ESCORIA

Son volcanes cónicos de tefra, la cual se acumula alrededor de un ventiladero volcánico y en dirección de sotavento. Sus dimensiones alcanzan hasta 300 m de alto y poseen pendientes cercanas a 30° , con bases de hasta 900 m de diámetro. Se componen predominantemente de fragmentos de escoria (de Silva & Lindsay, 2015).

• CONOS DE ESCORIA

• CONOS DE SPATTER

Son acumulaciones caóticas de *spatter aglutinado* y *soldado*, alrededor de un ventiladero volcánico, usualmente de tamaño pequeño y con pendientes superiores a 30° .

• CONOS DE ESCORIA/CONOS DE SPATTER

A spatter cone

B scoria cone

Fig. 1 A theoretical cross section of a spatter (a) and scoria (b) cone

• MAARES

Son cráteres circulares con un fondo plano, normalmente relleno de agua, que se formó durante la interacción explosiva entre el magma y un acuífero. El fondo del cráter se encuentra bajo el nivel del sustrato del volcán, y está rodeado por bordes de poca altura constituidos por escombros asociados con las explosiones (de Silva & Lindsay, 2015).

• MAARES

Cerro Overo

Antofagasta - Chile

Google Earth

Image © 2020 CNES / Airbus

700 m

• ANILLOS Y CONO DE TOBAS

Los anillos de tobas son mantos de tefra con pendiente suave $2-10^\circ$ que rodean a volcanes de tipo maar-diatrema. La tefra suele estar inalterada y finamente estratificada, y generalmente se asocia a proceso de caída y corrientes piroclásticas. Los conos se son una variante más alta de estos edificios, y se asocian a erupciones freatomagmáticas menos violentas (de Silva & Lindsay, 2015).

A maar-diatreme

B tuff cone

Extraído de Németh & Kereszturi (2015)

Scoria cone

Strombolian/ Hawaiian

Maar diatreme; tuff ring

Phreatomagmatic (Taalian)

Tuff cone

Phreatomagmatic (Surtseyan)

• TUYAS

Corresponden a volcanos producidos por procesos intra o subglaciares, y también se les conoce como cerros «mesa» (Thouret, 1999). Se producen al ocurrir extrusiones de lava en cavidades formadas al interior del hielo derretido por la actividad volcánica (Siebert et al., 2015).

TUYA

---- Water level

Pillow lava Hyaloclastite Flow-foot breccia Cap lava Intrusion

© Alex Wilson/Canadian Press – Table Mountain, British Columbia

Modificado de Jakobsson and Gudmundsson (2008)

Modificado de Edwards et al. (2015) - Herðubreið tuya

• COLADAS Y DOMOS DE LAVAS

Volcanes monogenéticos de carácter félsico (rico en sílice), asociados a lava de alta viscosidad, con composiciones dacíticas y ocasionalmente andesíticas. Son poco comunes, y pueden presentarse en forma de domos «torta», lavas tipo «coulée», domos cónicos o tapones de lava.

Basado en Thouret (1999), de Silva & Lindsay (2015)

❖ ESTRATOVOLCANES

También «compuestos», son edificios volcánicos usualmente cónicos construidos a partir de la superposición de numerosos eventos eruptivos. Poseen composiciones predominantes intermedias a ácidas, y desarrollan una cámara magmática somera. Pueden permanecer activos entre episodios eruptivos separados amplios por amplios espacios de tiempo, incluso por medio millón de años.

ESTRUCTURA DE UN ESTRATOVOLCÁN

(Siebert et al., 2015)

❖ VOLCANES EN ESCUDO

Son edificios volcánicos poligenéticos contruidos principalmente por coladas de lavas basálticas emitidas desde un cráter sumital, y por los flancos del volcán. También incluye algunos volcanes compuestos con composiciones más variadas y depósitos piroclásticos.

Mauna Loa

Hawaii, United States

Condado de Hawai

Honaunau-Napoopoo

Island of Hawai'i

Google Earth

Image © 2020 Maxar Technologies

© 2020 Google

Image Landsat / Copernicus

20 km

❖ FISURAS Y ZONAS DE RIFT

Un dique, al alcanzar la superficie, puede generar una erupción dominada por coladas de lava fluida y fuentes de lava, que a su vez producen edificios volcánicos alargados y que están constituidos principalmente por *spatters*

❖ FISURAS Y ZONAS DE RIFT

Un dique, al alcanzar la superficie, puede generar una erupción dominada por coladas de lava fluida y fuentes de lava, que a su vez producen edificios volcánicos alargados y que están constituidos principalmente por *spatters*

Google Earth

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

© 2020 Google

Image Landsat / Copernicus

Map Data © 2020 AND

Cumbre Vieja

Isla de La Palma - España

El Pueblo

Lomo Oscuro

Las Manchas

Jedey

Tigalate

Monte de Luna

El Remo
Google Earth

El Charco

Image © 2020 TerraMetrics
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image © 2020 GRAFCAN
© 2020 Google

3 km

Basado en Thouret (1999), de Silva & Lindsay (2015)

❖ CALDERAS DE EXPLOSIÓN

También llamadas «somma (no usar)», se asocian a grandes erupciones explosivas (Plinianas) que «truncan» las cimas de los volcanes, generando depresiones de menos de 10 km de diámetro.

Formas de las masas volcánicas

Caldera. Es una depresión circular (varios kilómetros de diámetro) que se forma normalmente por hundimiento, colapso, del edificio volcánico.

También pueden formarse por una fuerte explosión que elimina la cumbre del edificio volcánico [Mt Sant helens](#)

Calderas volcánicas

Las calderas volcánicas son depresiones circulares de tamaño muy superior al del cráter, pudiendo alcanzar varios kilómetros. Según su origen pueden ser:

- Caldera de explosión.
- Caldera de erosión.
- Caldera de colapso (ver figura).

FORMACIÓN DE UNA CALDERA DE COLAPSO. En la primera viñeta, a medida que avanza la erupción, la cámara magmática -poco profunda- se vacía progresivamente. En la segunda, se produce el hundimiento de la cúpula de la cámara magmática por su propio peso y por estar fuertemente agrietada. Finalmente se produce una gran depresión, en cuyo interior puede formarse un lago.

❖ CALDERAS DE COLAPSO SECTORIAL

Producidas por el deslizamiento de una ladera inestable de un volcán. Tienen característica forma de herradura, abierta hacia la dirección del deslizamiento. Están asociadas frecuentemente a un depósito de avalancha de detritos volcánicos, aunque si el deslizamiento es lento esta característica puede no existir

<https://www.youtube.com/watch?v=xDL-8f8URM8&feature=youtu.be>

Volcán Socompa

Antofagasta - Chile

Google Earth

US Dept of State Geographer
Image © 2020 Maxar Technologies
Image © 2020 CNES / Airbus
© 2020 Google

Isla de la Palma

Canarias - España

Google Earth

Image © 2020 TerraMetrics
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image © 2020 GRAFCAN
© 2020 Google

10 km

❖ POR MIGRACIÓN LATERAL DEL MAGMA

Un movimiento lateral del magma, desde la cámara magmática hacia afuera (intrusiones laterales de magma), que inducen su vaciamiento y el desarrollo de un hundimiento del edificio volcánico sin actividad explosiva. Ocurren principalmente en volcanes de escudo (p. ej. Fernandina en Galápagos) pero también en volcanes de Islandia e incluso en volcanes de arco.

a SHARKFIN UNIT
Eruption of subglacial and/or subaqueous pillow lavas and breccias.

b SHARKFIN UNIT
Evolution of subglacial to subaerial (cinder cone) eruptions. Eruption of Northwest Unit on northern slope.

c SHARKFIN UNIT
Caldera collapse.

d Accumulation of ice.

e SOUTH UNIT
Eruption of lava domes along caldera wall.

f PEAK UNIT
Lavas erupted subglacially and subaerially along caldera margin.

g ALPEHUE UNIT
Pyroclastic eruption at caldera margin.

h Flow of ice to fill Alpehúe crater. (Eruption of Chufquén cinder cone on northern flank; deposits not shown).

Fuente: Google Maps Vista 3D

❖ CALDERAS RESURGENTES

Se forman a partir de la subsidencia de gran parte del edificio volcánico (zonas de hasta 80 km de largo), producida por un vaciamiento rápido de parte de la cámara magmática, durante erupciones violentas (10-1000 km³). Estas calderas se rellenan posteriormente con ignimbritas, y eventualmente depósitos lacustres. En etapas post-colapso, es usual que se construyan domos, conos de escoria e incluso estratovolcanes, que determinan una fase resurgente del volcanismo.

After H. Williams, 1951

Fig. 9. Proximal and distal sections showing the Atana and Toconao ignimbrites thickening towards La Pacana caldera. P = Purico ignimbrite, PC = Pampa Chamaca ignimbrite, AT = Atana ignimbrite, TC = Toconao ignimbrite, PS = Pujsa ignimbrite, MC = Ignimbrita Antigua Múcar. See Fig. 11 for locations of profiles, and Fig. 10 for a photograph of section 3.

Fig. 12 a. New volume estimates for the Galán Ignimbrites (black bars). Previous volume estimates by Sparks et al. (1985) are shown as grey bars. Note: the previous estimates grouped the entire Toconquis

Group Ignimbrites into a single volume. b A cumulative volume graph of the Galán Ignimbrites

25°30'S
26°00'S
26°30'S

Caldera Cerro Galán (Argentina)
Folkes et al. (2011)
~1000 km³ (total acumulado)

Caldera del Diamante

Argentina - Chile

Glaciar	VII	IV	Zona de arranque
Depósitos lacustres	VI	III	Arco móntico
Glaciar de roca	V	II	Borde topográfico de caldera
Depósitos de remoción en masa	Vn. Don Casimiro	Unidades precaldera	Cráter
Depósitos aluviales y coluviales		Intrusivos neógenos	Lineamiento
Depósitos glaciares y periglaciares		Volcanitas neógenas	
		Sedimentitas mesozoicas	

❖ AGRUPAMIENTOS VOLCÁNICOS

Grupo o Complejo volcánico: Conjunto de centros de emisión formados por diferentes estructuras y productos volcánicos yuxtapuestos, que en algunos casos comparten un sistema alimentador y pueden estar genéticamente relacionados (Sernageomin).

Campo volcánico: Sector de la corteza en donde el volcanismo está excepcionalmente concentrado. Puede agrupar a volcanes monogenéticos y/o volcanes poligenéticos.

Puyehue-Cordón Caulle

Los Ríos - Chile

Google Earth

©2020 Google
Image © 2020 CNES / Airbus
US Dept of State Geographer

10 km

Snake River Plain

Idaho - United States

Google Earth

© 2020 Google
Image Landsat / Copernicus

50 km

La Payunia

Malargüe - Argentina

Reserva La Payunia

Google Earth

Image Landsat / Copernicus

© 2020 Google

30 km

MUCHAS GRACIAS !!!!!